

神戸赤十字病院 薬情 2025, 12, 22 (p)

藤岡 れい子 様へのお薬

令和07年12月22日

 微赤・錠剤 TV No 20	1 : アジルバ錠 20mg * 1日1回 朝食後 77日分 【効果効能】末梢の血管を広げて血圧を下げます。アンジオテンシン受容体拮抗薬と呼ばれています。 【注意事項1】めまい、ふらつきがおこることがありますので注意して下さい。 糖尿病の方は、本剤とアリスキレン(ラジレス)と併用すると腎機能が悪化するおそれがあるため、原則併用できません。 【後発品情報】先発品アジルバ錠20mg*(薬価76.3円)に対し、当薬局で取り扱いのある後発品は、アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(薬価30.2円)です。差額46.1円です。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>錠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	錠		1					
起	朝	昼	夕	寝	他	錠										
	1															
 白・錠 Sc 224	2 : ダイアート錠 30mg * 1日1回 朝食後 77日分 【効果効能】利尿薬で尿量を増やしてむくみをとるお薬です。 【後発品情報】先発品ダイアート錠30mg*(薬価10.7円)に対し、当薬局で取り扱いのある後発品は、アンセミド錠30mg「JG」(薬価10.4円)です。差額0.3円です。当薬局で取り扱いのある後発品は、アンセミド錠30mg「JG」(薬価10.4円)です。差額0.3円です。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>錠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	錠		1.5					
起	朝	昼	夕	寝	他	錠										
	1.5															
 淡黄・錠 パリエット10	3 : パリエット錠 10mg * 1日1回 朝食後 77日分 【効果効能】このお薬は胃酸の分泌を強力におさえて、胃・十二指腸潰瘍の症状を改善します。 【注意事項1】腸で溶けて作用するので、かまわずにそのままのおのみ下さい。制酸剤との併用で効果が弱くなることがあります。 【後発品情報】先発品パリエット錠10mg*(薬価35.8円)に対し、当薬局で取り扱いのある後発品は、ラベプラソールNa錠10mg「サワイ」(薬価24円)です。差額11.8円です。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>錠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	錠		1					
起	朝	昼	夕	寝	他	錠										
	1															
 白・淡黄白・錠 FY 321:0.5	4 : ユリス錠 0.5mg 1日1回 朝食後 77日分 【効果効能】尿酸が尿中に排泄されるのを促して、血液中の尿酸を減らします。痛風や高尿酸血症に用います。 【注意事項1】水分を多くとり、尿の量を増やすようにして下さい。 【後発品情報】ユリス錠0.5mgに後発品は存在しません。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>錠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	錠		1					
起	朝	昼	夕	寝	他	錠										
	1															
 淡黄・顆粒	5 : シナール配合顆粒 1日3回 毎食後 77日分 【効果効能】ビタミンCとパントテン酸の配合剤です。ビタミンCが必要な場合や、食事からの摂取が不十分な場合の補給に用いられます。 【注意事項1】尿糖検査結果を陽性から陰性に変えることがあります。 【後発品情報】シナール配合顆粒に後発品は存在しません。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>包</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	包		1	1	1			
起	朝	昼	夕	寝	他	包										
	1	1	1													
 白色・口腔内崩壊錠 TC12	6 : ピラノアOD錠 20mg 1日1回 就寝前(空腹時) 77日分 【効果効能】炎症やアレルギー症状を抑える抗ヒスタミン薬です。 【注意事項1】水なしで服用できるお薬です。水がないときは、唾液で溶かしながら服用して下さい。寝たままの場合は、水で服用して下さい。 【注意事項2】過去に薬により体調に変化があらわれた経験がある方はお知らせ下さい。 【後発品情報】ピラノアOD錠20mgに後発品は存在しません。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> <th>錠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他	錠					1		
起	朝	昼	夕	寝	他	錠										
				1												



当薬局は緊急時の調剤に対応できる体制を整備しています。
 営業時間外に緊急の調剤を必要とする事態が生じた場合には携帯へご連絡ください。
 営業時間：平日9:00~18:00 土曜日9:00~12:30
 携帯電話090-5970-4088

ここに示しました副作用は、ほとんど発現はみられません
 注意すべき副作用は上記のとおりです。万が一、このような副作用がみられた場合には、医師または薬剤師にご連絡下さい。

<お薬に関するお問い合わせ先>
 処方医：神戸赤十字病院
 佐藤 淳哉先生 TEL: 078-231-6006
 HAT神戸薬局
 TEL: 078-251-6242 FAX: 078-251-6222



藤岡 れい子 様へのお薬 令和07年12月22日

 <p>ジクトルテープ 75mg</p> <p>白～淡黄・貼付剤</p>	<p>1 : ジクトルテープ 75mg</p>	<table border="1"> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他						
起	朝	昼	夕	寝	他									
<p>1日1回 (1回1枚)</p>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
<p>【効果効能】痛みと炎症を抑える貼り薬です。 【注意事項1】貼付部の水分を十分ふき取り、指示された枚数をお貼り下さい。貼る場所は毎回変更し、傷や湿疹、放射線照射部への貼付は避けて下さい。眠気やめまい、眼のかすみが起こることがあります。本剤とトリアムテレン(トリテレン)を併用すると、お互いの薬の副作用が増強されて、急性腎不全をおこすことがあります。 【注意事項2】アスピリン喘息や消化性潰瘍の方は使用できません。 【後発品情報】ジクトルテープ 75mg に後発品は存在しません。</p>														
 <p>タリージェ OD 2.5</p>	<p>2 : タリージェ OD錠 2.5mg</p>	<table border="1"> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他						
起	朝	昼	夕	寝	他									
<p>1日2回 朝夕食後 90日分</p>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1		1								
	1		1											
<p>【効果効能】神経障害性疼痛を改善するお薬です。 【注意事項1】水なしでも服用可能です。眠気、めまいが起こることがありますので、車の運転や機械の操作は控えて下さい。 【注意事項2】意識消失が現れた場合はご連絡ください。 【後発品情報】タリージェ OD錠 2.5mg に後発品は存在しません。</p>														
 <p>サインバルタカプセル 20mg *</p>	<p>3 : サインバルタカプセル 20mg *</p>	<table border="1"> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他						
起	朝	昼	夕	寝	他									
<p>1日1回 朝食後 90日分</p>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1										
	1													
<p>【効果効能】①気持ちを楽にして意欲を高めます。②痛みを和らげる作用があります。 【注意事項1】ねむくなったり、注意力がなくなることがありますので、車の運転や機械の操作をするときは注意して下さい。 【後発品情報】先発品サインバルタカプセル 20mg * (薬価72.8円) に対し、当薬局で取り扱いのある後発品は、デュロキセチンカプセル 20mg 「KMP」 (薬価25.7円) です。差額47.1円です。</p>														
 <p>デノタスチュアブル配合錠</p> <p>ほとんど白色～微黄色・チュアブル錠</p>	<p>4 : デノタスチュアブル配合錠</p>	<table border="1"> <tr> <th>起</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝</th> <th>他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	起	朝	昼	夕	寝	他						
起	朝	昼	夕	寝	他									
<p>1日1回 朝食後 90日分</p>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2										
	2													
<p>【効果効能】カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合錠です。 【注意事項1】口の中で溶かすか、かみ砕いて服用して下さい。 【後発品情報】デノタスチュアブル配合錠に後発品は存在しません。</p>														



当薬局は緊急時の調剤に対応できる体制を整備しています。
 営業時間外に緊急の調剤を必要とする事態が生じた場合には携帯へご連絡ください。
 営業時間：平日9:00～18:00 土曜日9:00～12:30
 携帯電話090-5970-4088

ここに示しました副作用は、ほとんど発現はみられませんが注意すべき副作用は上記のとおりです。万が一、このような副作用がみられた場合には、医師または薬剤師にご連絡下さい。


<お薬に関するお問い合わせ先>
 処方医：神戸赤十字病院
 TEL: 078-231-6006


森田 卓也先生

HAT神戸薬局
 TEL: 078-251-6242 FAX: 078-251-6222



藤岡 れい子 様へのお薬 令和07年12月22日

 白色不透明・カプセル	7:アミティーザカプセル12μg	起	朝	昼	夕	寝	他	カプセル
	1日2回 朝夕食後 77日分		2		2			
【効果効能】 排便をうながすお薬(下剤)です。 【解説】 便の水分を増やして、やわらかくするはたらきがあります。 【注意事項1】 薬の作用により、下痢、吐き気、おなかが痛いなどの症状がおこることがあります。 【注意事項2】 便秘による腹痛がある方、過去に薬により体調に変化があらわれた経験がある方は医師に申し出てください。 【後発品情報】 アミティーザカプセル12μgに後発品は存在しません。								
 淡黄白〜淡黄・液	8:カリメート経口液20%	起	朝	昼	夕	寝	他	包
	1日1回 夕食後 77日分				1			
【効果効能】 体内のカリウムの量を下げ、高カリウム血症を改善するお薬です。 【注意事項1】 開封後は速やかに服用して下さい。制酸剤との併用で効果が弱くなることがあります。 【後発品情報】 カリメート経口液20%に後発品は存在しません。								



当薬局は緊急時の調剤に対応できる体制を整備しています。
 営業時間外に緊急の調剤を必要とする事象が生じた場合には携帯へご連絡ください。
 営業時間: 平日9:00~18:00 土曜日9:00~12:30
 携帯電話090-5970-4088

ここに示しました副作用は、ほとんど発現はみられませんが注意すべき副作用は上記のとおりです。万が一、このような副作用がみられた場合には、医師または薬剤師にご連絡下さい。

<お薬に関するお問い合わせ先>
 処方医: 神戸赤十字病院 TEL: 078-231-6006
 佐藤 淳哉先生
 HAT神戸薬局 
 TEL: 078-251-6242 FAX: 078-251-6222

藤岡 れい子 様へのお薬 令和07年12月22日

 無〜微黄透明・液	1 : テルピナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」	起	朝	昼	夕	寝	他	R
	1日1回 (爪)							
【効果効能】 抗真菌薬で、水虫などを治療する塗り薬です。 【注意事項1】 目やひどくただれた部分には使用しないで下さい。ひびわれた部分やただれた部分に使用するとしみる場合があります。火気を避けて保存して下さい。 【注意事項2】 過去に薬により体調に変化があらわれた経験がある方はお知らせ下さい。 【後発品情報】 テルピナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」は後発品です。								
 クリーム	2 : ニゾラールクリーム 2%	起	朝	昼	夕	寝	他	B
	1日1回 (足)							
【効果効能】 抗真菌薬で、水虫などを治療する塗り薬です。 【注意事項1】 目やひどくただれた部分には使用しないで下さい。 【後発品情報】 ニゾラールクリーム 2%には後発品が存在しますが、当薬局では取り扱っておりません。								
 白〜淡黄・軟膏・硬膏	3 : ユベラ軟膏	起	朝	昼	夕	寝	他	B
	1日1回 (足の先 全体的に)							
【効果効能】 皮膚の角化を改善したり血行をよくする塗り薬です。ビタミンAとEが含まれています。 【注意事項1】 目には使用しないで下さい。冷所に保存して下さい。 【後発品情報】 ユベラ軟膏に後発品は存在しません。								



当薬局は緊急時の調剤に対応できる体制を整備しています。
 営業時間外に緊急の調剤を必要とする事態が生じた場合には携帯へご連絡ください。
 営業時間：平日9：00～18：00 土曜日9：00～12：30
 携帯電話090-5970-4088

ここに示しました副作用は、ほとんど発現はみられませんが注意すべき副作用は上記のとおりです。万が一、このような副作用がみられた場合には、医師または薬剤師にご連絡下さい。

<お薬に関するお問い合わせ先>
 処方医：神戸赤十字病院
 TEL: 078-231-6006

松下 奈那恵先生

HAT神戸薬局
 TEL: 078-251-6242 FAX: 078-251-6222

