

お薬の説明書

2026年 3月13日

病棟
東3階病棟

処方 高田 晴子様


患者番号 0001403706
部屋番号 0318号室

効能、効果は一般的なものを記載している為、医師の説明と少し異なる事があります。
注意事項についても、すべての副作用について記載しているわけではありませんので、
いつもと違った症状があらわれた時は早めにご相談ください。

【医療法人 川崎病院 兵庫県神戸市兵庫区東山町3-3-1 TEL:078-511-3131】

お薬の名前	ツムラ猪苓湯【40】2.5g/包 (医療用)					()
	朝食前	昼食前	夕食前		単位	
	1	1	1		包	
1日3回 分3 毎食前					14日分	

【効能効果】 おしっこが出にくい、トイレの回数が多い、おしっこのときに痛みがある、残尿感、血尿、炎症などの症状をやわらげる薬です。

お薬の名前	加ナール錠300					(SD 113:)
白色の素錠 	朝食後	昼食後	夕食後		単位	
混ぜて分包しています	2	2	2		錠	
1日3回 分3 毎食後					14日分	

【効能効果】 熱を下げたり、痛みをやわらげたりする薬です。

【注意事項】 今までにアスピリンやその他の解熱剤、鎮痛剤などを飲んで、喘息が出たことのある方は必ずお知らせください。

胃腸障害を少なくするために食直後または食後に飲んでください。

飲酒の習慣のある方は、肝臓の病気を起こすことがありますので、この薬を飲んでいる間はお酒を飲まないでください。

【副作用】 服用中、発熱、咳、息苦しさなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、喘鳴(息をするときゼーゼー、ヒューヒューいう)、呼吸困難などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、発熱、のどが痛いなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、倦怠感、発熱、発疹、むくみ、尿量減少などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、発熱、皮膚がかゆい、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、意識障害などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、動悸、冷や汗、顔面蒼白、呼吸困難、顔やまぶたのはれ、顔や体が赤くなる、じんま疹などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、高熱、紅斑、水ぶくれ、口内炎、目の充血、赤くなった皮膚に小さな白いブツブツが出るなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

お薬の名前	リンゼス錠0.25mg					(@ 725:)
	朝食前				単位	
	2				錠	
1日1回 分1 朝食前					14日分	

【効能効果】 腸での水分の分泌や便の移動を促進し、便秘の症状を改善する薬です。

【副作用】 服用中、下痢がひどいようでしたら、すぐに医師にお知らせください。

次ページあり

お薬の説明書

2026年 3月13日

病棟
東3階病棟

お名前
高田 晴子様

患者番号 0001403706
部屋番号 0318号室

お薬の名前	アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「アール」 ()				
淡褐色透明 軟カプセル剤	朝食後				単位
	1				cap
混ぜて分包しています	1日1回 分1 朝食後				14日分

【効能効果】 腸管からのカルシウムの吸収を促進し、骨がもろくなるのを防ぐ薬です。
ビタミンDの不足などによる骨の病気やその他の症状を改善する薬です。

【注意事項】 カルシウムやビタミンDを多く含む健康食品や薬を使用する際は、医師にご相談ください。

【副作用】 服用中、むくみ、尿量減少、倦怠感などの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。
服用中、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる、体のかゆみなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

お薬の名前	メチバール錠500 μ g (@ 322:)				
白色の糖衣錠	朝食後	昼食後	夕食後		単位
	1	1	1		錠
混ぜて分包しています	1日3回 分3 毎食後				14日分

【効能効果】 神経に働き、しびれ、痛み、まひなどを改善する薬です。

お薬の名前	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サイル」 (リマプロスト5)				
白色の素錠	朝食後	昼食後	夕食後		単位
	1	1	1		錠
混ぜて分包しています	1日3回 分3 毎食後				14日分

【効能効果】 血液の流れが悪くなることによって起こる手足のしびれや痛み、冷感などの症状を改善する薬です。

【副作用】 服用中、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、褐色尿、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、皮膚がかゆいなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

お薬の名前	ロバランカプセル100mg (EN100@)				
紅色/白色 硬カプセル剤 3号	朝食後	昼食後	夕食後		単位
	1	1	1		cap
混ぜて分包しています	1日3回 分3 毎食後				14日分

【効能効果】 血液中のコレステロールや中性脂肪の量を下げる薬です。
血液の流れを改善する薬です。

次ページあり


お薬の説明書

2026年 3月13日

病棟
東3階病棟

処方 高田 晴子様


患者番号 0001403706
部屋番号 0318号室

お薬の名前	ヒトシブ錠10mg (ヒトシブ)				(EPez:)
 長径 8.1mm 短径 4.1mm 厚さ 2.4mm 混ぜて分包しています		朝食後			単位
		1			錠
	1日1回	分1	朝食後		14日分

【効能効果】 血液中のコレステロールの量を下げる薬です。

【注意事項】 この薬を飲んでいいる間も、食事療法、運動療法を続けてください。


【副作用】 服用中、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる、体のかゆみなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

お薬の名前	ヒソパ 00-ルマル酸塩錠0.625mg「トワ」				(Tw 700: 0.625)
白色の割線入り素錠		朝食後			単位
 Tw 700 0.625 混ぜて分包しています		1			錠
	1日1回	分1	朝食後		14日分

【効能効果】 心臓の働きを助ける薬です。

【注意事項】 服用中にめまい、ふらつきなどが起こることがありますので、車などの運転には注意してください。

【副作用】 服用中、脈が遅くなる、めまい、ふらつきなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。
服用中、倦怠感、疲れやすい、動くときの息切れ、むくみ、横になるより座っているときに呼吸が楽になるなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

お薬の名前	タリジェ IOD錠5mg				(タリジェ I OD5: タリジェ I OD5)
白色の割線入り素錠 口腔内崩壊錠		朝食後		夕食後	単位
 タリジェ OD 5 混ぜて分包しています		1		1	錠
	1日2回	分2	朝夕食後		14日分

【効能効果】 痛みをやわらげる薬です。

【注意事項】 舌の上へのせ湿らせ、舌で軽くつぶし、唾液のみで飲むことができます。また、普通のお薬のように水で飲むこともできます。

アルコールを含む飲料水は薬の作用を強くしますので避けてください。

服用中にめまい、眠気、意識がなくなるなどの症状があらわれることがありますので、車などの運転をしないように注意してください。

【副作用】 服用中、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる、体のかゆみなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

服用中、めまい、眠気、意識がなくなるなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

次ページあり